

Le sindromi influenzali in Piemonte

Settimana 7 – dal 13 al 19 febbraio 2017




livello basale
intensità bassa
intensità media
intensità alta
intensità molto alta

Attività dei virus influenzali a BASSA intensità*

*L'attività dei virus influenzali in Piemonte è calcolata con il metodo Moving Epidemic Method (MEM) dell'ECDC sulla base delle stagioni epidemiche precedenti. **Le soglie di intensità sono più alte delle soglie di riferimento nazionali.**




Si avvia alla conclusione la stagione influenzale 2016/2017. L'incidenza settimanale delle Sindromi Influenzali (ILI) in Piemonte è di 3,8 casi per 1000 assistiti, pari a meno di 17000 casi stimati, in diminuzione.



L'attività dei virus influenzali è iniziata in anticipo rispetto alla stagione precedente (2015/2016) e l'andamento della curva epidemica è più simile a quello delle stagioni 2014/2015 e 2012/2013 che a quello dell'ultima stagione 2015/2016. Il picco di incidenza è stato raggiunto nell'ultima settimana del 2016, con un valore di 13 casi per 1000 assistiti.

L'incidenza è in diminuzione nell'età pediatrica (8,3 casi per 1000 assistiti) e tra 14 e 64 anni (3,3 casi per 1000 assistiti), mentre rimane stabile negli ultrasessantacinquenni (2,5 casi per 1000 assistiti).



Sono stati isolati virus di tipo A:H3N2 e, dall'inizio di gennaio, anche di tipo A:H1N1 e B.