

Le sindromi influenzali in Piemonte

Settimana 9 – dal 27 febbraio al 5 marzo 2017




Attività dei virus influenzali ai livelli di base



*L'attività dei virus influenzali in Piemonte è calcolata con il metodo Moving Epidemic Method (MEM) dell'ECDC sulla base delle stagioni epidemiche precedenti. **Le soglie di intensità sono più alte delle soglie di riferimento nazionali.**

Si sta concludendo la stagione influenzale 2016/2017. L'incidenza settimanale delle Sindromi Influenzali (ILI) in Piemonte è ai livelli di base, al di sotto della soglia epidemica regionale ed è 3 casi stimati per 1000 assistiti.



L'attività dei virus influenzali è iniziata in anticipo ed ha registrato incidenze settimanali maggiori rispetto alla stagione precedente (2015/2016), con un andamento più simile a quello delle stagioni 2014/2015 e 2012/2013.

Il valore massimo di incidenza (13 casi per 1000 assistiti) è stato raggiunto nell'ultima settimana del 2016.

L'incidenza è diminuita in tutte le fasce d'età:

- nell'età pediatrica (5,8 casi per 1000 assistiti)
- tra 14 e 64 anni (3 casi per 1000 assistiti),
- negli ultrasessantacinquenni (1,5 casi per 1000 assistiti).

Sono stati isolati per la maggior parte virus di tipo A:H3N2 e, dall'inizio di gennaio, anche di tipo A:H1N1 e B

