

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PEDIATRICHE

Offerta attiva e gratuita

Vaccino	1° Anno				2° Anno		6°-7° anno	Dopo i 10 anni	
	3° mese	5° mese	7° mese	11° mese	13° -15° mese	15° -18° mese		12° anno	12° - 16° anno
Ciclo di base	Esavalente	Esavalente		Esavalente			DTPa-IPV		Tdpa-IPV
Pneumococco	PNC	PNC		PNC					
Meningococco	Men B	Men B	Men B		Men C	Men B			Men ACWY
Rotavirus	Rotavirus								
Morbillo Parotite Rosolia Varicella					MPRV 1		MPRV 2		
Varicella									VAR (2 dosi distanziate di almeno 4 settimane)
Papilloma virus umano								HPV (2 dosi distanziate di almeno 5/6 mesi a seconda del prodotto)	

LEGENDA

ESAVALENTE (Ciclo di base):

- **DTPa** vaccino anti-Difterite-Tetano-Pertosse acellulare – formulazione pediatrica
- **IPV** vaccino anti-Poliomielite Inattivato
- **HBV** vaccino anti-Epatite B
- **Hib** vaccino anti-*Haemophilus influenzae b*

PNC vaccino anti-Pneumococco coniugato

Men B vaccino anti-Meningococco B a 4 componenti

RotaV vaccino anti-Rotavirus

MPRV vaccino anti-Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella (per i nati dal 2016)

MPRV 1: 1^a dose – MPRV 2: 2^a dose

Tdpa vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acellulare - formulazione adulti

Men C vaccino anti-Meningococco C coniugato

VAR vaccino anti-Varicella

VAR 1: 1^a dose – VAR 2: 2^a dose

HPV vaccino anti-Papilloma virus umano

Men ACW₁₃₅Y vaccino anti-meningococco A, C, W₁₃₅, Y coniugato

T₀ somministrazione della 1^a dose (Tempo 0)

1 mese somministrazione della 2^a dose a distanza di 1 mese dalla 1^a dose

6 mesi somministrazione della 3^a dose a distanza di 6 mesi dalla 1^a dose

3° mese di vita periodo che intercorre dal compimento della 8^a settimana di vita fino alla 12^a settimana di vita.

6° anno d'età periodo che intercorre dal compimento dei 5 anni al compimento dei 6 anni.