

Il Dirigente

Torino, (*) 1/08/2018
Protocollo n. (*) 17064/A1409A
(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.30-1/2014A/A14000

Ai Referenti Attività Vaccinali
e p.c. Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Direttori Sanitari
Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione
Ai Sigg. Direttori dei Distretti Socio
Sanitari
delle ASL della Regione Piemonte

LORO SEDI

**Oggetto: Aggiornamento riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) del
Vaccino anti meningococco B**

Con nota n. 8152/A14000 del 31 marzo 2017, la regione Piemonte ha recepito il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 e ha trasmesso a tutte le ASL le istruzioni operative per la sua attuazione.

Tra le novità previste vi era l'introduzione della vaccinazione, attiva e gratuita, contro il meningococco B per i nati a partire dal 01.01.2017 con un ciclo a 4 dosi (3 dosi entro l'anno di vita, seguite da un richiamo nel secondo anno) con il seguente calendario:

- 1° dose di meningococco B al 3° mese (dal 75° al 90° giorno di età),
- 2° dose di meningococco B al 5° mese (dal 135° al 150° giorno di età),
- 3° dose di meningococco B al 7° mese (dal 181° al 210° giorno di età),
- 4° dose di meningococco B al 15°-18° mese di età (entro i 24 mesi e comunque ad almeno 6 mesi dalla 3° dose).

Alla luce degli ultimi aggiornamenti dell'RCP, e solo nel caso in cui la prima dose del ciclo venisse somministrata dopo il compimento dei 3 mesi (dal 91° giorno e fino al 150° giorno) si

raccomanda di utilizzare un ciclo a 3 dosi con le seguenti tempistiche, come indicato nell'RCP del vaccino:

- 1° dose di meningococco B al 4° mese (dal 91° giorno di età),
- 2° dose di meningococco B al 6° mese (dal 151° giorno di età, e **comunque ad almeno 2 mesi dalla 1° dose**),
- 3° dose di meningococco B tra i 12 e 15 mesi di età (ad **almeno 6 mesi dalla 2° dose** e comunque entro i 24 mesi), tenendo presente che deve essere data la precedenza alla 1° dose di MPRV e al MNC C.

Si segnala un'altra modifica dell'RCP che riguarda i bambini di età compresa tra 2 e 10 anni: il ciclo è di **2 dosi somministrate a distanza di almeno 2 mesi** (in precedenza era sufficiente 1 mese).

Si invia in allegato l'RCP del vaccino aggiornato al 28 giugno 2018, disponibile al link: <https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=042687>

Si prega di dare la massima diffusione ai soggetti interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Gianfranco GORGIANI LOIA



Allegato. N: 1